

Eludril PRO

Solution pour bain de bouche Composition en substances actives (pour 100 ml de solution pour bain de bouche) : solution de **digluconate de chlorhexidine 0,5 ml, chlorobutanol hémihydraté 0,5 g. Titre alcoolique : 42,8% (v/v).**

Excipients : glycérol, docusate de sodium, éthanol à 96 pour cent, lévomenthol, solution alcoolique d'huile essentielle de menthe, eau purifiée, rouge cochenille A (E124).

Flacon de 500 ml avec gobelet-doseur Indications : ce médicament est préconisé comme traitement local d'appoint des affections de cavité

buccale et lors de soins postopératoires en odonto-stomatologie.

N'utilisez jamais EludrilPro, solution pour bain de bouche dans le cas suivant : hypersensibilité (allergie) à la Chlorhexidine, au chlorobutanol ou aux autres constituants de la solution.

Précautions particulières : ne pas mettre le produit au contact des yeux et du nez. Ne pas introduire le produit dans le conduit auditif. En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, la conduite à tenir doit être réévaluée. Une utilisation prolongée peut exposer à une coloration des dents, obturations et prothèses.

Grossesses et allaitement : pendant la grossesse ou l'allaitement, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient à effet notoire : alcool, rouge cochenille A (E124).

Prise ou utilisation d'autres médicaments: l'utilisation simultanée ou successive d'autres antiseptiques est à éviter compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation ...) veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Posologie et mode d'administration : RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
Utilisation locale en bain de bouche. Ne pas avaler. La solution doit être diluée avant utilisation.

Posologie usuelle : 10 à 15 ml de solution 2 fois par jour (à diluer dans le gobelet doseur en complétant jusqu'au trait supérieur avec de l'eau tiède) : effectuer le bain de bouche jusqu'à épuisement du gobelet doseur. Si nécessaire, cette posologie peut être portée à 3 fois par jour, sachant que la dose maximale est de 20 ml (à diluer), 3 fois par jour. Se brosser les dents avant chaque utilisation et rincer soigneusement la bouche à l'eau avant d'utiliser Eludril Pro, solution pour bain de bouche. La durée du traitement peut être de 2 semaines dans les inflammations gingivales et les parodontites. La durée de traitement ne pourra être prolongée au-delà de 2 semaines que sur avis médical.

Surdosage : un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette solution pour bain de bouche. Toutefois, en cas de passage systémique (par voie générale), des manifestations de toxicité neurologique, peuvent apparaître. Elles seraient à traiter en milieu spécialisé.

En cas d'oubli : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Effets indésirables éventuels : risque de sensibilisation à l'un des composants de la solution. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Date de révision du texte : février 2011 **Médicament autorisé n°** : 3400935121431 **Agrée aux collectivités**
Information médicale : tél. 0800 95 05 64

Exploitant : PIERRE FABRE MEDICAMENT 28 av du Sidobre – 81100 Castres

**Fabricant : PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION Rue du lycée – Zone industrielle de Cuiry – 45
500Gien**

Titulaire : PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel-Gance – 92654 Boulogne Cedex